



ใบบันทึกการรับทราบข้อมูลและยินยอมให้ทำการผ่าตัดคลอด

เขียนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
วันที่.....

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ป่วย).....อายุ.....ปี HN.....
หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน.....เกี่ยวข้องเป็น.....ของ.....(ชื่อผู้ป่วย)
เลขที่บัตรประชาชน.....

ข้าพเจ้าและ (สามี, บิดา, มารดา.....) ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอด
ดังต่อไปนี้ ๑. เหตุผล/ความจำเป็นในการผ่าตัด (แยกด้านมารดา ด้านทารก)

เคยมีประวัติการผ่าตัดคลอดบุตร

การคลอดติดขัด

เหตุผลอื่นๆ.....

ทางเลือกการรักษาอื่นของการคลอด ได้แก่ การคลอดทางช่องคลอดปกติ หรือใช้เครื่องมือช่วยคลอดทางช่องคลอด แต่
แพทย์วินิจฉัยว่าถ้าปล่อยให้คลอดทางช่องคลอดอาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้

ระยะเวลาการผ่าตัดโดยประมาณ ๑ ชั่วโมง ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่รวมระยะเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดระยะแรก ระยะเวลา
ในการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ๒-๕ วัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน

๒. ข้อดีของการผ่าตัดคลอด

๒.๑ ช่วยคลอดในกรณีคลอดทางช่องคลอดไม่ได้ เช่น การมีสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกกับกระดูกเชิงกรานของ
มารดา ทารกท่าผิดปกติ รกเกาะต่ำ

๒.๒ ช่วยการคลอดให้รวดเร็วในกรณีเร่งด่วน เช่น มีหลักฐานแสดงถึงภาวะทารกขาดออกซิเจน สายสะดือย้อย
เป็นต้น

๒.๓ กรณีเคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือผ่าตัดมดลูก หากปล่อยให้เจ็บครรภ์คลอด อาจทำให้เกิดการปริหรือ
แตกที่มดลูก บริเวณแผลผ่าตัดเก่าได้

๓. ข้อเสียของการผ่าตัดคลอด

๓.๑ เกิดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าท้อง และปวดแผลมากกว่าการคลอดทางช่องคลอด

๓.๒ มีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าการคลอดทางช่องคลอด

๔. ภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัดคลอด

๔.๑ ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึก พบประมาณร้อยละ ๐.๕ เช่นการสำลักน้ำหรือเศษอาหาร
เข้าไปในหลอดลม ความดันโลหิตต่ำ ช็อก

๔.๒ แผลผ่าตัดที่ตัวมดลูกอาจฉีกขาดไปจนถึงปากมดลูก ช่องคลอด หรือเส้นเลือดที่มดลูก พบได้ประมาณ
ร้อยละ ๑-๒ ทำให้เสียเลือดมากในขณะผ่าตัด

๔.๓ อันตรายต่ออวัยวะข้างเคียงพบประมาณร้อยละ ๐.๑ เช่น กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต และลำไส้

๔.๔ อันตรายต่อทารกพบประมาณร้อยละ ๑-๒ เช่น กระดูกหัก โดนมีดบาด

๕. ภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัดคลอด

๕.๑ มดลูกอักเสบติดเชื้อ พบประมาณร้อยละ ๐.๖

๕.๒ แผลผ่าตัดติดเชื้อพบประมาณร้อยละ ๒.๕-๖

๕.๓ ติดเชื้อในช่องท้องและมีหนองในอุ้งเชิงกราน การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ทางเดินหายใจ

๕.๔ ตกเลือดในช่องท้อง พบประมาณร้อยละ ๐.๕

๕.๕ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด พบน้อยกว่าร้อยละ ๐.๑

๕.๖ มารดามีโอกาสเสียชีวิตจากการผ่าตัดคลอด พบประมาณ ๑ ราย ต่อการผ่าตัด ๑๒,๐๐๐ ราย

๕.๗ ทารกอาจมีภาวะหายใจเร็วผิดปกติเกิดขึ้นชั่วคราวหลังคลอด พบได้ร้อยละ ๓.๑

๖. การใช้ยาระงับความรู้สึกก่อนการผ่าตัดคลอด ทำได้ ๒ วิธี คือ

การฉีดยาชาเข้าบริเวณไขสันหลัง หรือที่เรียกว่าบล็อกหลัง เป็นการแทงเข็มขนาดเล็กเข้าช่องน้ำไขสันหลังระดับ
เดียวกันกับบั้นเอว เพื่อจะฉีดยาชาเข้าไปทำให้หมดความรู้สึกเฉพาะส่วนล่างของร่างกาย ตั้งแต่เหนือเอวเล็กน้อยลงไปถึงนั้เท้า
ข้อดี คือทารกไม่ถูกกดการหายใจ และมารดาสามารถรู้สึกตัวขณะผ่าตัด ทำให้คุณแม่สามารถชื่นชมทารกได้ทันทีหลังเกิด นอกจากนี้

ฤทธิ์ของยาอาจช่วยลดอาการเจ็บแผลในระยะหลังคลอดใหม่ๆ แต่ต้องใช้แพทย์ที่มีความชำนาญในการทำ และอาจต้องใช้เวลาในการทำหัตถการนานกว่าวิธีดมยาสลบ

การดมยาสลบ เป็นการฉีดยาให้หลับแล้วใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในหลอดลม ข้อดีคือ ใช้เวลาในการเตรียมไม่นาน เหมาะสำหรับในรายที่ต้องการให้ทารกคลอดอย่างรวดเร็ว ข้อเสียคือ อาจเกิดการหายใจของทารก ทำให้ทารกเขียวได้ ในรายที่มารดาใส่ท่อช่วยหายใจยาก อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสำลักอาหารเข้าปอดเกิดการติดเชื้อในปอด และมีอาการเจ็บคอได้

สำหรับการเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล และความพร้อมของโรงพยาบาล ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วน โรคหรือภาวะแทรกซ้อนของมารดา ข้อบ่งชี้และข้อบ่งห้ามของการระงับความรู้สึกแต่ละวิธี

อนึ่งภายหลังผ่าตัดคลอด อาจเกิดภาวะตกเลือดรุนแรงจนต้องตัดมดลูกเพื่อเป็นการช่วยชีวิตของผู้คลอด ตลอดจนการรักษาอื่นๆ เช่น การให้เลือดหรือยาหรืออาจจะมีการผ่าตัดอื่นๆตามความจำเป็นและตามที่แพทย์เห็นสมควรในภาวะวิกฤตินั้น

ข้าพเจ้าและ.....ได้รับทราบว่าการคลอดจะมีทางเลือกอื่นของการคลอดและการผ่าตัดคลอด มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน แต่สมัครใจที่จะคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดคลอดและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงลงบันทึกเพื่อเป็นการยืนยันความต้องการคือ

มีความยินยอมให้ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดอื่นๆตามความจำเป็น

ลงชื่อ/ผู้ให้ความยินยอม..... ลงชื่อพยาน/ญาติผู้คลอด.....
(.....) (.....)
ความสัมพันธ์กับผู้คลอด.....

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ.....พยานเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น.

หมายเหตุ: กรณีผู้คลอดอายุน้อยกว่า ๑๗ ปี สามียังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี จำเป็นต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองหรือญาติที่ใกล้ชิด ลงบันทึกยินยอมผ่าตัดร่วมด้วยทุกครั้ง